

表1 抗うつ剤の分類・用量および副作用

作用機序および機能的分類	開始用量	標準用量	過剰投与 による死亡 率	不眠と興奮	鎮静作用	副作用の程度				
						低血圧	抗コリン性 作用(注1)	吐き気また は消化器系 への影響	性的機能 障害	体重増加
mg/day										
<b>再取り込み阻害薬</b>										
選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)										
Fluoxetine(Prozac)	20	20~40	低	中	無~弱	無~弱	無~弱	中	中	弱
Paroxetine(Paxil) パキシル	20	20~40	低	中	無~弱	無~弱	弱	中	中	弱
Sertraline(Zoloft) Jゾロフト	50	50~150	低	中	無~弱	無~弱	無~弱	中	中	弱
Fluvoxamine(Luvox) ルボックス、デプロメー ル	50	100~250	低	中	中	無~弱	無~弱	中	中	弱
Citalopram(Celexa)	20	20~40	低	中	無~弱	無~弱	無~弱	中	中	弱
Escitalpram(Lexapro)	10	10~20	低	中	無~弱	無~弱	無~弱	中	中	弱
選択的ノルエピネフリン再取り込み阻害薬 (NRI)										
Reboxetine(Edrona) (注2)	4~8	8~12	低	弱	無~弱	無~弱	無~弱	弱	弱	無~弱
非選択的ノルエピネフリン再取り込み阻害薬										
Desipramine(Norpramine)	25~50	100~300	高	弱	無~弱	中	弱	無~弱	弱	弱
Nortriptyline(Pamelor) ノリトレン	25~50	75~200	高	弱	弱	弱	無~弱	無~弱	弱	弱
Maprotiline(Ludiomil) ルジオミール	75	75~200	高	弱	無~弱	弱	弱	無~弱	無~弱	中
複合あるいは二方面に作用する 再取り込み阻害薬・古い世代の薬 (TCA)三環系抗うつ剤										
Amitriptyline(Elavil) トリプタノール	25~50	100~300	高	無~弱	弱	弱	強	無~弱	弱	中
Dothiepin(Dothep) (注2)	25~50	100~300	高	無~弱	弱	弱	中	無~弱	弱	中
Clopipramine(Anafranil) アナフラニール	25~50	100~250	高	弱	中	中	中	弱	弱	中
Imipramine(Tofranil) トフランニール	25~50	100~300	高	中	弱	中	中	無~弱	弱	中
新世代の薬 (非TCA)非三環系抗うつ剤										
Venlafaxine(Effeor) NRI + SRI	37~75	75~225	中	中	無~弱	無~弱	無~弱	中	中	無~弱
Milnacipran(lexel)* NRI + SRI トレドミン	50~100	100~200	低	中	無~弱	無~弱	無~弱	中	中	無~弱
Bupropion(Welbutrin) NRI + DRI	150	150~300	低	中	無~弱	無~弱	弱	弱	無~弱	無~弱
Duloxetine(Cymbalta) NRI + SRI	30	30~90	低	無~弱	中	無~弱	弱	弱	無~弱	無~弱

作用機序および機能的分類	開始用量	標準用量 mg/day	過剰投与 による死 亡率	不眠と興奮	鎮静作用	副作用の程度				
						低血圧	抗コリン性作 用(注1)	吐き気または 消化器系へ の影響	性的機能 障害	体重増加
<b>MAOI (モノアミン酸化酵素阻害薬)</b>										
不可逆性の薬										
Phenelzine(Nardil)	15	30-90	高	中	弱	中	弱	弱	中	弱
Tranylcypromine(Parnate)	10	20~60	高	中	弱	中	弱	弱	中	弱
Isocarboxazid(Marplan)	20	20~60	高	中	無~弱	中	弱	弱	中	中
Selegiline(Eldepryl)	10	20~40	中	弱	無~弱	弱	弱	弱	弱	弱
可逆性の薬										
Moclobemide(Manerix) (注2)	150	300~600	低	中	無~弱	無~弱	弱	弱	無~弱	無~弱
<b>複合作用を有する新世代の薬</b>										
Mirtazapine(Remeron) (5-HT <sub>2</sub> +5HT <sub>3</sub> + 2-アドレナリン自己受容体)	30	30~60	低	無~弱	強	弱	無~弱	無~弱	無~弱	強
Mianserin(Bolvidon) <b>テトラミド</b> (5-HT <sub>2</sub> +α <sub>1</sub> & 2-アドレナリン自己受容体) (注2)	30	30~60	低	無~弱	強	中	無~弱	無~弱	無~弱	強
Nefazodone(Serzone)(5-HT <sub>2</sub> 受容体)	100	300~600	低	無~弱	中	中	中	中	無~弱	中
Trazodone(Desyrel) <b>デジレル</b> (5-HT <sub>2</sub> + 1 自己受容体)	50~100	200~600	低	無~弱	強	中	無~弱	中	中	中

投与量は通常精神病治療の慣行にしたがい記載したが、必ずしも"Physician's Desk Reference"や薬の使用説明書と照合確認はされていない。

個別の詳細評価、副作用に関しては「米国精神医学会ガイドライン2000年版」または、AHRQ(現在の医療研究・品質調査機構)の1999年版を参照のこと。

(注1)口の渇き、便秘、発汗、目のかすみ、尿閉状態などの症状を指す。

(注2)これらの薬は米国では認可されていない。